

	ホスピタリスト (N=73)	コントロール (N=73)	P値
在院日数			
平均(SD)	11.4(2.6)	13.4(4.3)	0.012
中央値[25%tile, 75%tile]	9.0[3.0, 37.0]	12.0[3.0, 53.0]	0.016
DPC入院期間, n(%)			
入院期間I	42(57.5)	38(52.1)	0.693
入院期間II	27(37.0)	29(39.7)	
入院期間III	4(5.5)	6(8.2)	
入院医療費 円 平均(SD)	522,539(226,810)	603,932(310,527)	0.073
培養結果に応じた適切な 抗菌薬の変更, n(%)	63(86.3)	51(69.9)	0.027
抗菌薬の経口薬変更, n(%)	58(79.5)	41(56.2)	0.004
抗菌薬投与期間			
平均(SD)	11.9(2.6)	13.4(4.3)	0.013
中央値[25%tile, 75%tile]	14.0[7.0, 18.0]	14.0[3.0, 28.0]	0.022
尿路感染症の原因検索, n(%)	35(47.9)	20(27.4)	0.016
血液検査の回数			
平均(SD)	4.7(2.3)	6.1(3.2)	0.003
中央値[25%tile, 75%tile]	4.0[1.0, 11.0]	5.0[2.0, 17.0]	0.003
尿路感染症再燃による 30日再入院, n(%)	3(4.1)	2(2.7)	1.0
前回入院中の不適切なケアによる 再入院や予期せぬ外来受診, n(%)	2(2.7)	4(5.5)	0.681
入院死亡, n(%)	0(0)	1(1.4)	0.492

SD, standard deviation; DPC, Diagnostic Procedure Combination;
UTI, urinary tract infection.